

MYCOSIS PRODUCED BY DERMATOPHYTES AND YEASTS

Sanabria R., Fariña N., Laspina F., Balmaceda M.A., Samudio M.

Departamento de Microbiología, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Asunción

RESUMEN

La región tropical ofrece el clima y las condiciones naturales propicias para el desarrollo y proliferación de hongos productores de micosis superficiales. El propósito de este estudio fue determinar la prevalencia de dermatofitos y hongos levaduriformes productores de micosis superficiales en pacientes de 0 a 75 años con signos clínicos de dermatomycosis superficial, que concurren al Departamento de Microbiología (IICS) desde enero de 1997 a junio del 2001. Las muestras biológicas de la lesión se tomaron del cuero cabelludo, piel y de la zona periungueal con bisturí. Una parte de la muestra se analizó por examen directo con KOH mediante observación microscópica (400X) y la otra parte se cultivó en medios agar Sabouraud + cloranfenicol, agar Biggy y agar micobiótico y se incubó durante 3 semanas a 28°C. La identificación de las cepas aisladas se realizó por las características microscópicas y macroscópicas de las colonias. De un total de 640 pacientes con signos clínicos de dermatomycosis, el 47% fue positivo. De los 303 pacientes positivos, el 45% correspondió a niños y 55% a adultos. Hubo predominancia del sexo femenino ya que el 59% eran mujeres en relación a un 45% de pacientes del sexo masculino. De los 136 niños, el 74% de los niños presentó lesiones en cuero cabelludo, el 21% presentó tinea de piel y el 5% presentó lesiones en uña. El dermatofito que se aisló con mayor frecuencia en niños fue *Microsporium canis* ya que se aisló en el 38% de los pacientes, seguido de un 32% en el que se aisló *Trichophyton mentagrophytes*, un 17% con *Trichophyton rubrum*, 7% con *Candida sp*, 4,5% con *Microsporium gypseum* y 1,5% con *Malassezia furfur*. En los 167 adultos, el 61% presentó lesiones en piel siendo ésta la localización más frecuente seguida de un 39% que presentó lesiones en uñas. El hongo que se aisló con mayor frecuencia en adultos fue *Candida sp* que se encontró en el 44,9% seguido de un 27,5% en el que encontró *T. rubrum*, un 12,6% con *T. mentagrophytes*, un 9% con *M. furfur*, un 4,8% con *Trichophyton sp*, 0,6% con *M. canis* y 0,6% con *M. gypseum*. En este estudio, no se aisló el género *Epidermophyton* que se menciona frecuentemente en Europa.

Palabras claves: Dermatofitos, Hongos levaduriformes, Micosis superficiales

ABSTRACT

Tropical regions offer the climate and natural conditions suitable for the growth and proliferation of fungi causing superficial dermatomycosis. The purpose of this study was to determine the prevalence of dermatophytes and yeast producing superficial mycosis in patients (0 - 75 years old) with dermatomycosis clinical signs, referred to the Microbiology department (IICS) from January 1997 to June 2001. Biological samples were extracted from the lesions by scraping or scalping and then analyzed under direct microscopy (400X) with KOH and cultured in Petri plates by using Sabouraud with chloranfenicol agar, Biggy agar and mycobiotic aga. All plates were incubated for 3 weeks at 28°C for fungi isolation and identification was carried out through micro and macro morphological characteristics of colonies. Out of 640 patients with clinical signs of dermatomycosis referred to the laboratory, 303 yielded positive results for fungi by direct and culture examinations. Forty five percent of the positive samples corresponded to children (0 - 15 years old) and 55% to adults. Fifty nine percent corresponded to women and 41% to men. In the 136 children, tinea capitis was the most common body lesion as 74% presented that lesion followed by a 21% presenting skin lesions and 5% with nail lesions. In the children, the frequencies of etiologic agents were as follows: *Microsporium canis* in 38%, *Trichophyton mentagrophytes* in 32%, *Trichophyton rubrum* in 17%, *Candida sp* in 7%, *Microsporium gypseum* in 4.5% and *Malassezia furfur* in 1.5%. In the 167 adult patients, tinea capitis was not registered and the most common body lesion was skin lesion presented by 61% followed by nails lesions presented by 39%. The frequencies of isolated species were as follows: *Candida sp* in 44.9%, *T. Rubrum* in 27.5%, *T. mentagrophytes* in 12.6%, *M. Furfur* in 9%, *Trichophyton sp* in 5%, *M. canis* in 0.6% and *M. gypseum* in 0.6%. *Epidermophyton* genus, frequently reported in Europe, was not isolated in this study.

Key words: Dermatophytes, Yeasts, Superficial dermatomycosis.

INTRODUCCION

Las micosis superficiales son las afecciones más comunes de la piel y motivo frecuente de consulta dermatológica. Las mismas son producidas por dermatofitos y hongos levaduriformes. Los dermatofitos, que tienen la capacidad de digerir la queratina de la piel y nutrirse de ella, comprenden tres géneros: *Microsporium*, *Epidermophyton* y *Trichophyton*, y en función a su hábitat se clasifican en geófilos, zoófilos y antropófilos, respectivamente. Entre los hongos levaduriformes que causan infecciones en la piel citamos a: *Cándida sp*, levadura oportunista, componente de la flora normal humana, *Malassezia furfur*, levadura lipofílica que forma parte de la flora normal de la piel y el cuero cabelludo, es agente causal de la pitiriasis versicolor y de la dermatitis seborreica (1,2,3,4). El tratamiento de las dermatofitosis se realiza en muchas ocasiones en forma empírica, lo cual puede alterar la presentación de la lesión, debido al uso incorrecto de medicamentos. La frecuencia de aislamiento de las diferentes especies varía según las áreas geográficas, formas clínicas, factores socioeconómicos, climáticos y demográficos. Un estudio realizado en Zaragoza, España demostró un predominio de especies zoofílicas siendo el agente aislado con mayor frecuencia en tinea corporis y tinea capitis el *Microsporium canis* (44%), seguido de *Trichophyton mentagrophytes* (31,4%) y *T. rubrum* (18,6%). Además se aislaron *E. floccosum* (2,6%), *M. gypseum* (1,4%), *T. verrucosum* (0,7%), *T. violaceum* (0,2%), y *M. audouinii*. En forma similar en Córdoba, España también se aislaron especies zoofílicas en tinea corporis y tinea capitis con prevalencias de los siguientes agente etiológicos: *M. canis* (36,7%), *T. mentagrophytes* (22,7%), *E. floccosum* (18,3%) y *T. rubrum* 10,7% (5,6). En Nigeria, en un estudio realizado en niños predominó la tinea capitis (10,8%), seguido de tinea corporis 5,8%. Los dermatofitos predominantes fueron *T. mentagrophytes* (19,4%), *T. tonsurans* (12,3%). En Porto Alegre, Brasil el dermatofito predominante fue *T. rubrum* (55,3%) seguido de *T. mentagrophytes* (21,5%) (7,8). En un estudio sobre dermatomycosis en el Gran Resistencia Chaco, Argentina se observó una alta incidencia de micosis superficiales producidas por hongos levaduriformes *Candida sp* (37%) *M. furfur* (17%), dermatofitos (41%) y otras levaduras (2%) (9). En otro estudio realizado en la Argentina se aislaron dermatofitos (40,66%) siendo *M. canis* la especie aislada con mayor prevalencia (41,7%), *T. rubrum* (38,5%), *Epidermophyton floccosum* (6,4%), *M. gypseum* (5,6%) y *T. mentagrophytes* (4,8%) (10). Estudios realizados en Paraguay demostraron un predominio de *Trichophyton sp* 38%, *Malassezia furfur* 25%, *Candida sp* 23%, *Microsporium sp* 12%, *Epidermophyton sp* 2%. En el 80% de las onicomycosis se aisló *Candida sp*. del cuero cabelludo, 71% correspondió a *Trichophyton sp*, 26% a *M. canis* y 3% a *M. gypseum* (11). Paraguay está ubicado en la zona tropical de América del Sur, con una temperatura promedio en el verano de 38°C, el clima es cálido y húmedo, condiciones que favorecen el desarrollo y proliferación de hongos. Se insiste en la determinación periódica de la frecuencia de los agentes etiológicos de dermatomycosis superficial, en función a factores socioeconómicos, geográficos, demográficos, climáticos, como medida de prevención epidemiológica, ya que aún son escasos los estudios publicados en nuestro país. El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de dermatofitos y hongos levaduriformes que producen micosis superficiales en pacientes de 0 - 75 con sospecha clínica de dermatomycosis superficial que concurren al departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud desde enero de 1997 hasta junio de 2001 a través de un estudio descriptivo de corte transversal.

MATERIALES Y METODOS

Se obtuvieron escamas dérmicas por raspado con bisturí de los bordes activos de la lesión, previa desinfección del cuero cabelludo con alcohol de 70°C. Además de raspar con bisturí los pelos afectados, también se los recogió con pinzas.

En las uñas las muestras se tomaron con bisturí de la región periungueal, previo lavado con solución de cloruro de sodio. Una parte de la muestra se analizó por examen directo con KOH mediante observación microscópica (400x) y la otra parte de la muestra se sembró en placas, conteniendo medios de cultivos: agar Sabouraud + cloranfenicol, con agar micobiótico, agar Biggy que se incubaron durante 2 a 3 semanas a 28°C.

Los cultivos se identificaron por características microscópicas según la morfología y disposición de los conidios y por las características macroscópicas de las colonias (12, 13).

RESULTADOS

Un total de 640 pacientes (0-75 años) concurrió al laboratorio de Microbiología del IICS con sospecha clínica de dermatomicosis superficial desde enero de 1.997 a junio de 2.001. Trescientos tres casos resultaron positivos (47%), confirmados por exámenes directos y cultivos, de los cuales 45% correspondió a niños (0-15 años) y 55% a adultos (16-75 años). Entre los pacientes con resultados positivos, 59% correspondió al sexo femenino y 41% al sexo masculino.

Cuando se distribuyeron en grupos etarios los 303 pacientes con dermatomicosis superficial se encontró que la población más afectada fue la de los niños de 0 a 15 años (45%), seguida por el grupo de 16 a 30 años (21%), el de 46 a 60 años (16%), el de 31 a 45 (12%) y el de 61 a 75 años (6%).

Se observó una mayor prevalencia de dermatofitos en la población pediátrica (62%) con respecto a la de los adultos (46%), mientras que en los adultos la prevalencia de hongos levaduriformes fue mayor (54%) que en los niños (38%). La diferencia fue estadísticamente significativa, ($p < 0,001$, OR 12,08 IC 95% 5,96-24,94) (Ver Figura 1).

En la Tabla 1 se relaciona la etiología y la localización de la lesión. En niños, la localización más frecuente fue en el cuero cabelludo (74%), seguido de tiña de piel (21%) y de uña (5%). El dermatofito aislado con mayor frecuencia en niños fue *Microsporum canis* (38%) seguido de *T. mentagrophytes* (32%), *T. rubrum* (17%), *Candida sp* (7%), *M. gypseum* (4,5%) y *Malassezia furfur* (1,5%).

En la Tabla 2 se relaciona la etiología con la localización en adultos. En ellos, la localización más frecuente fue piel (61%), seguido de uñas (39%) pero no se registraron casos de tiña de cuero cabelludo. La levadura aislada con mayor frecuencia en adultos fue *Candida sp* (44,9%), seguido de *T. rubrum* (27,5%), *T. mentagrophytes* (12,6%), *M. furfur* (9%), *Trichophyton sp* (5%), *M. canis* (0,6%) y *M. gypseum* (0,6%).

TABLA 1

Agentes etiológicos de dermatomicosis superficial según la localización de la lesión en niños (0-15 años)

Especies	Cuero cabelludo	Piel	Uña	Total
<i>M. canis</i>	50	2	0	38% (52)
<i>T. mentagrophytes</i>	34	9	0	32% (43)
<i>T. rubrum</i>	13	9	1	17% (23)
<i>Candida sp</i>	0	4	6	7% (10)
<i>M. gypseum</i>	3	3	0	4,5% (6)
<i>M. furfur</i>	1	1	0	1,5% (2)
Total	74% (101)	21% (28)	5% (7)	136

Microsporum canis fue el agente etiológico más frecuente en niños


La localización más frecuente de la lesión fue cuero cabelludo

TABLA 2

Agentes etiológicos de dermatomicosis superficial según la localización de la lesión en adultos (16-75 años)

Especies	Piel	Uña	Total
<i>Candida sp</i>	18	57	44,9% (75)
<i>T. rubrum</i>	43	3	27,5% (46)
<i>T. mentagrophytes</i>	19	2	12,6% (21)
<i>M. furfur</i>	15	0	9% (15)
<i>Trichophyton sp</i>	5	3	4,8% (8)
<i>M. canis</i>	1	0	0,6% (1)
<i>M. gypseum</i>	1	0	0,6% (1)
Total	61% (102)	39% (65)	167

En los adultos la localización más frecuente de la lesión fue piel y no se registraron casos de tiña de cuero cabelludo. Las candidiasis ungueales revelaron un claro predominio.



Mayor prevalencia de dermatofitos en niños (41%) que en adultos (25%)

Mayor prevalencia de hongos levaduriformes en adultos (30%) que en niños (4%)

DISCUSION

La concordancia entre el exámen micológico y el diagnóstico clínico fue de 47%, similar a la obtenida en España (6). Posiblemente, el tratamiento empírico al que se exponen los pacientes sea la causa que modifica la presentación de la lesión y dificulta la identificación del agente etiológico.

Se observó que el número de afectado fue mayor en las edades más tempranas, disminuyendo paulatinamente con el aumento de edad. Doscientos pacientes (66%) del total de los afectados eran menores de 30 años, hallazgo que coincide con una reciente publicación brasilera (14).

En niños, los dermatofitos mostraron mayor prevalencia (41%) que los hongos levaduriformes (4%), mientras que en los adultos las levaduras demostraron mayor prevalencia (30%) que los dermatofitos (25%), resultados similares a los publicados en Argentina (9,10).

El número de aislamientos de cepas fue superior en la población femenina (59%) que en la masculina (41%), hallazgos que coinciden con la literatura internacional (5,6,14).

Los resultados de este estudio demostraron un predominio de las especies zoofilicas al igual que en Argentina y España (5,6,10), pero no fueron aislados dermatofitos del genero *Epidermophyton*, frecuentemente mencionados en Europa.

En niños, la localización más frecuente de la lesión fue en el cuero cabelludo y el dermatofito con mayor prevalencia fue *M. canis* seguido de *T. mentagrophytes*, mientras que el agente etiológico menos frecuente fue *Malassezia furfur*.

En adultos no se registraron casos de tiña de cuero cabelludo, pero hubo un claro predominio de las candidiasis ungueales. El dermatofito aislado con mayor frecuencia en la piel fue *T. rubrum* seguido de *T. mentagrophytes*, en comparación a los hallazgos obtenidos en otro estudio realizado en nuestro país donde el agente etiológico predominante en cuero cabelludo fue *Trichophyton sp.* Sin embargo, ambos estudios coinciden en que *Candida sp* fue el agente aislado con mayor frecuencia en lesiones sub-ungueales (11).

Malassezia furfur, levadura lipofílica causante de pitiriasis versicolor, se aisló con mayor frecuencia en adultos 9% (15/167) que en niños 1% (2/136), resultado similar a una reciente publicación brasilera (14).

El examen directo demostró ser de gran utilidad para el diagnóstico clínico de la lesión y el tratamiento. El examen directo positivo es indicación de tratamiento antifúngico inmediato y por consiguiente, la disminución de la morbilidad del proceso e interrupción precoz de la cadena epidemiológica.

Insistimos en la importancia de realizar periódicamente la determinación de la frecuencia de aislamiento de los agentes etiológicos de dermatomicosis superficial, por las implicancias clínicas y epidemiológicas que esto conlleva.

REFERENCIAS

1. Rippon JW. Medical Mycology. 3ra edición. 1988; P. 169-196.
2. Torres-Rodríguez JM. Micosis que afectan la piel y mucosas. 1987; P 6-12, 171-173.
3. Koneman R. Micología. Práctica de laboratorio. 3ra edición. 1987; P. 125-177.
4. Flores L, Carballo GM, Muñoz E. del V. Tinea capitis en la senectud. Rev. Arg. De Micol. 1988; 21:21-24.
5. Fortuño B, Torres L, Simal E., Seoane A., Uriel JA, Santacruz C. Dermatofitos aislados en muestras clínicas. Estudio de 5 años en Zaragoza. Enferm Infec Microbiol Clin 1997; 15:536-539.
6. Casal M, Linares MJ, Fernandez JC, Solis F. Dermatofitos y dermatofitosis en Córdoba (España). Enferm Infec Microbiol Clin 1991;; 9:491-494.
7. Okafor JI, Agbugbaeruleke AK. Dermatophytoses among school children in Aba, Abia state-Nigeria and some physiological studies on the isolated agents. J. Commun. Dis. 1998; 30 (1):44-49.
8. Mezzari A. Frequency of dermatophytes in the metropolitan area of Porto Alegre, Brazil. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 1988; 40(2): 71-6.
9. Giusiano G. Gunia M. Mangiaterra M. Bogado M. Hongos levaduriformes productores de micosis superficiales, Boletin del Instituto de Medicina Regional 1999;(20) p 24
10. Mangiaterra ML. Giusiano GE., Alonso JM, Pons De Storni L, Waisman R. Dermatofitos en el Gram Resistencia, Chaco (Argentina) Boletin de Medicina Regional 1999; (20) p 24.
11. Martinez M, Zárate MN. Prevalencia de dermatofitos aislados de lesiones descamativas en piel, cuero cabelludo y uñas. Resúmenes de trabajos científicos. 3er Congreso Paraguayo de Química. 1996; P. 101-102.
12. Frey D, Oldfield RJ, Brigde RC. A colour atlas of pathogenic fungi 1979; p. 21-67.
13. Davise H, Larone. Medically important fungi third edition 1995; p. 63-79, 161-183.
14. Farias L, Oliveira E, Albuquerque D, Alcantara P, Lacerda MF, Peixoto MF, Silva V, Epidemiologic study of pitiriasis versicolor in the state of Paraíba, Brasil. RBA C 2001 Vol 33 (2) 63- 67.